



## Gamm vert vous conseille

**A**CHETEZ LES JEUNES volailles de préférence au début du printemps, voire en mai ou en juin pour les régions à climat rude et pour les espèces moins


rustiques. Le moment toujours critique et délicat de l'acclimatation des poussins à l'extérieur pourra ainsi avoir lieu à la meilleure époque de l'année.

rature interne. Retirez l'éleveuse après six semaines, les petits étant devenus parfaitement autonomes.

**LES MANGEOIRES** en fer galvanisé évitent le gaspillage de nourriture grâce à un couvercle pourvu de trous d'alimentation. Elles se nettoient facilement et peuvent être désinfectées à la flamme après utilisation.

Lorsque les poussins sont laissés avec leur mère, placez leur mangeoire hors de la portée de la poule. Si elle consomme leur nourriture, il vous sera difficile de contrôler la nutrition des jeunes.

**LES ABREUVOIRS** destinés aux poussins ont une contenance plus réduite que ceux prévus pour les adultes. Les modèles siphonnés sont bien adaptés. Terminez l'installation de la poussinière en accrochant au mur un thermomètre et un hygromètre.



*L'observation du plumage des jeunes permet de reconnaître leur sexe et de séparer les femelles destinées à la ponte.*

supérieure à celle des lampes traditionnelles) ou de systèmes à plaques chauffantes. Quel que soit le modèle adopté, il doit permettre un nettoyage et une désinfection faciles et rapides. Pendant quelques semaines, vous pouvez installer un paravent tout autour de l'éleveuse pour limiter les courants d'air froids et conserver la chaleur à son maximum.

La protection n'est plus utile au bout de trois semaines, car les poussins commencent à réguler leur tempé-

## Une vie très bien réglée

**L**ES POUSSINS restent dans la poussinière du jour de leur naissance jusqu'à leur emplumage définitif. Prévoyez une surface de 1 m<sup>2</sup> pour vingt poussins d'un jour. À partir de l'âge de trois semaines, donnez-leur un plus grand espace (3 m<sup>2</sup>), au fur et à mesure de leur croissance. Une surface insuffisante entraîne des maladies. Quelques heures avant l'arrivée des poussins,

allumez la lampe pour que la poussinière atteigne la bonne température pour les recevoir. Maintenez une atmosphère chauffée à 33 °C. Diminuez peu à peu la température, semaine après semaine, en passant à 26 °C, puis à 24 °C, 22 °C et en fin 20 °C. Changez la litière dès que l'odeur d'ammoniaque devient perceptible. Le duvet des poussins doit toujours rester bien propre.



*Un matériel spécifiquement adapté aux besoins des poussins évite le gaspillage des aliments.*